


Allstar®

Sisteminis fungicidinis beicas, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį, skirtas bulvių gumbų apsaugai nuo baltosios kojelės, sidabriškųjų rauplių ir bulvių antraknozės.



BEICAS



Veiklioji medžiaga

fluksapiroksadas 300 g/l



Produkto forma

koncentruota suspensija (SC)



Pakuotė

5 l



VEIKIMO BŪDAS

Fluksapiroksadas veikia kaip sukcinatų dehidrogenazės inhibitorius (SDHI cheminė grupė). Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleidamas gamintis energijai ir taip pat stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę, tokių kaip amino rūgščių ir lipidų.

NAUDOJIMO NORMA IR LAIKAS

Norma: 20 ml/100 kg gumbų apvėlimas prieš sodinimą arba sodinimo metu.

Norma: 0,8 l/ha purškiant ant gumbų vagose sodinimo metu

Liga	Efektyvumas
Baltoji kojelė	●●●
Sidabriškosios rauplės	●
Bulvių antraknozė	●

Liga	Efektyvumas
Baltoji kojelė	●●
Sidabriškosios rauplės	●●
Bulvių antraknozė	●●

●●● – veiksmingas (>80 %), ●● – vidutiniškai veiksmingas (60–80 %), ● – mažina (40–59,9 %).

Augalai	Ligos	Panaudojimo metodai	Panaudojimo laikas	Naudojimo norma	Maksimalus panaudojimo skaičius
Bulvės	Baltoji kojėlė, šašai (rizoktoniozė)	Beicuojant gumbus	Prieš sodinimą (naudojant beicavimo mašiną)	20 ml/100 kg gumbų (3000 kg gumbų/ha)	1
	Sidabriškosios rauplės		Sodinimo metu (naudojant sodinimo mašinoje integruotą beicavimo sistemą)		
	Bulvių antraknozė	Purškiant gumbus vagose	Sodinimo metu (naudojant sodinimo mašiną su integruotais purkštukais)	0,8 l/ha	1

APDOROJIMO TECHNIKA IR BŪDAI

ALLSTAR galima naudoti 3 būdais.

Tirpalas, skirtas bulvių gumbų beicavimui, turi būti išpurkštas kaip įmanoma tolygiau, kad padengtų visą bulvės paviršių. Ant bulvių gumbų neturi būti likusių žemių, o bulvės sveikos ir nepažeistos mechaniškai.

Prieš sodinimą, naudojant beicavimo mašiną. Beicuojant gumbus prieš sodinimą su beicavimo mašina, rekomenduojamas produkto kiekis yra 20 ml/100 kg gumbų.

Sodinimo metu, (purškiant bulvių gumbus) naudojant sodinimo mašinoje integruotą beicavimo sistemą. Apdorojant sodinimo metu sodinimo mašinoje su integruota beicavimo sistema, rekomenduojamas produkto kiekis yra 20 ml/100 kg gumbų, kas atitinka 0,6 l/ha, jei sodinama 3000 kg/ha bulvių gumbų.

Sodinimo metu, (purškiant į vagas) naudojant sodinimo mašiną su integruotais purkštukais, tirpalas taip pat gali būti išpurškiamas į vagas. Tuomet rekomenduojama norma yra 0,8 l/ha. Kai purškama į vagas, geriausia, kai naudojami du purkštukai vienai vagai.

VANDENS KIEKIS

Priklausomai nuo apdoravimo būdo, ALLSTAR turėtų būti naudojamas su 60–200 l/ha vandens sodinimo metu. Naudojant beicavimo mašiną rekomenduojamas vandens kiekis yra 1,4–2,4 l/t bulvių gumbų. Kadangi mašinos ir techninė įranga skiriasi, vandens kiekis gali skirtis nuo rekomenduojamo.