

Basagran® 480

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti sudygusias dviskiltes piktžoles vasarinių kviečių, kvietrugių, miežių, avižių su dobilų ir/arba varpinių žolių įsėliu, kukurūzų, linų, žirnių ir pupų, šviežių žirnių ir pupų su ankštimis ir be ankščių, pasėliuose.



Herbicidas



Veiklioji medžiaga:

bentazonas 480 g/l



Produkto forma

vandenyje tirpus koncentratas (SL)



Pakuotė

5 l



VEIKIMO BŪDAS

BASAGRAN 480 yra kontaktinis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti darbinio tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina produkto veikimą.

BASAGRAN 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.

BASAGRAN 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. BASAGRAN 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po BASAGRAN 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.

BASAGRAN 480 VEIKSMINGUMAS NUO PIKTŽOLIŲ:

Labai veiksmingas (>90 %) nuo: bekvapių šunramunių, daržinių žliūgių, dirvinių čižučių, dirvinių kežių, garstukų, kibiųjų lipikų, paprastųjų gaivų, paprastųjų žilių, rapsų pabirų, rugiagėlių, svėrių, žvaginių.

Veiksmingas (70–90 %) nuo: barboryčių, burnočių, dėmėtųjų rūgčių, dirvinių neužmirštuolių, dirvinių pienių, dirvinių vijoklių, gailiųjų dilgėlių, smulkiažiedžių galinsogų, juodųjų kiauliuogių, paprastųjų kiaulpienių, paprastųjų kiečių, raudonžiedžių notrelių, vaistinių žvirbliarūčių, žilių.

Mažiau veiksmingas (40–70 %) nuo: aguonų birulių, baltųjų balandų, dirvinių aklių, dirvinių našlaičių, dirvinių usnių, krapažolių, notrelių, rūgštynių, takožolių, vijoklinių pelėvirkščių (vijoklinių rūgčių), vikių, veronikų.

AUGALAI IR NORMOS

Augalai	Norma, l/ha	Naudojimas
Vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai, avižos, su dobilų ir/arba varpinių žolių įsėliu	2,0	Pasėliai purškiami dviejų-keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 12–14). Nors BASAGRAN 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti rekomenduojama ankstyvuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės herbicidui.
Kukurūzai	2,0	Pasėliai purškiami, kai išsiskleidžia 2–9 poros kukurūzų lapelių (BBCH 12–19).
Linai	2,0	Purškiami, kai linai turi 2–9 poras tikrųjų lapelių (BBCH 12–19).
Žirniai, žalieji žirneliai su ankštimis ir be ankščių	2,0	Purškiami, kai žirniai turi 2 lapelius iki stiebo augimo pabaigos (BBCH12–39).
Pupos, pupos su ankštimis ir be ankščių	2,0	Purškiami, kai pupos turi 2 lapelius iki dar nepradėjus augti pagrindiniam stiebui (BBCH 12–29). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Purškiami ne daugiau kaip vieną kartą, jei naudojama 2,0 l/ha BASAGRAN 480.

Jei purškiami per 2 kartus (pvz: 1,0 + 1,0 l/ha), neviršyti maksimalios normos 2,0 l/ha. Purškiant per 2 kartus – intervalas tarp purškimų 7–14 dienų.

Pastaba: dobilų ir vienaskilčių žolių įsėlis gali būti sėjamas praėjus kelioms dienoms po purškimo su BASAGRAN 480. Javai su sudygusiu raudonųjų ir baltųjų dobilų įsėliu bei vienaskilčių žolių ir dobilų mišiniu gali būti purškiami, kai ankštiniai augalai turi ne mažiau kaip 1 tikrąjį lapelį. Vienaskiltės žolės turi pasiekti 3 lapelių tarpsnį.

MAIŠYMAS

Purškiant javus, galima maišyti su hormoninio tipo herbicidais, pvz. 2.4 D amino druska, MCPA. Būtina griežtai laikytis rekomendacijų. Javuose purškiant BASAGRAN 480, galima maišyti su augimo reguliatoriumi CYCOCEL 750 ar BASF fungicidais.

SĖJOMAINA

Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po BASAGRAN 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.

PASTABOS

- Nepurškite, jei prognozuojamos šalnos.
- Basagran 480 veikia per lapus, todėl purškimo metu augalai turi būti tolygiai padengti.
- Vandens naudojama daugiau nei įprastai: 300–500 l/ha.
- Purškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą.
- Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių. Purškiant vėliau, Basagran 480 veiksmingumas gali mažėti, nes piktžolės perauga. Paaugę javai uždengia piktžoles ir jų nepasiekia darbinis tirpalas.
- Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti. Puršksti su Basagran 480 galima ir kai yra nedidelė rasa. Kai rasa didelė, darbinis tirpalas su rasos lašais gali nutekėti ant žemės.
- Purškiant šiltu ir sausu oru, Basagran 480 maišykite su augaline alyva, tuomet pagerėja veiksmingumas nuo baltųjų balandų. Nemašykite Basagran 480 su augaline alyva, kai karšta ir drėgna ir kai oro temperatūra aukštesnė kaip +21 °C.
- Basagran 480 geriausiai veikia, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12 °C.
- Nepurškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25 °C, ypač dienos viduryje. Tokiu atveju atidėkite purškimą iki vakaro. Tai ypač svarbu, kai saulėtas ir karštas periodas prasideda po to, kai ilgą laiką buvo šalta, debesuota ir lietinga.

Jei purškiama per du kartus (1,0+1,0 l/ha), neviršyti maksimalios normos – 2,0 l/ha.

Vandens kiekis – 300–500 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 6 val.