

# Flexity®

Sisteminis benzofenonų cheminės klasės fungicidas, naudojamas žieminių kviečių apsaugai nuo miltligės ir stiebalūžės, vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių apsaugai nuo miltligės.



**FUNGICIDAS**



**Veiklioji medžiaga:**  
metrafenonas 300 g/l



**Produkto forma**  
koncentruota suspensija (SC)



**Pakuotė**  
5 l



## VEIKIMO BŪDAS

FLEXITY yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose naudojamas krūmijimosi pabaigoje – antrojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–32), jis veiksmingas ir nuo žieminių kviečių stiebalūžės.

FLEXITY veiklioji medžiaga **metrafenonas** priklauso benzofenonams. Metrafenono veikimas yra lokaliai sisteminis, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį. Metrafenonas, patekęs ant grybienos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms. Maksimali rekomenduojama norma – 0,5 l/ha FLEXITY veikia iki 6 savaičių, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir oro sąlygų. Geriausiai FLEXITY veikia, kai naudojamas profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Jei FLEXITY naudojamas mišiniuose su kitais fungicidais, norma gali būti mažinama iki 0,25 l/ha.

## AUGALAI IR LIGOS

Augalai	Ligos	Norma, l/ha	Naudojimas
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Miltligė	0,25–0,5	Purškiama bamblių pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30–65). Didžiausias purškimų skaičius nuo miltligės, naudojant 0,5 l/ha – 1.
Žieminiai kviečiai	Stiebalūžė	0,25–0,5	Purškiama bamblių pradžioje – antrojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–32). Didžiausias purškimų skaičius – 1. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Miltligė	0,25–0,5	Purškiama bamblių pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30–65). Didžiausias purškimų skaičius, naudojant 0,5 l/ha – 1. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

## MAIŠYMAS

FLEXITY galima maišyti su BASF herbicidais, BASF augimo reguliatoriais, BASF fungicidais. FLEXITY taip pat galima maišyti su kokybiškomis mikroelementinėmis trąšomis.

- Galima maišyti su karbamiu, jei naudojate ne daugiau kaip 20 kg/ha (produkto) ir oro temperatūra neviršija +20 °C, maža santykinė oro drėgmė. Jei didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių apdeginimai.
- Prieš maišydami karbamidą gerai ištirpinkite. Pirmiausiai pilamas FLEXITY bei kiti maišymo partneriai, po to ištirpintas karbamidas.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.