

Focus[®] Ultra

Sisteminis herbicidas sudygusioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti daugelyje lauko, sodo, daržo ir kitų kultūrose.



HERBICIDAS



Veiklioji medžiaga:
cikloksidimas 100g/l



Produkto forma
koncentruota emulsija (EC)



Pakuotė
5 l, 10 l



Garbanotuose (Savojos), gūžiniuose, žiediniuose, Briuselio, Pekino ir lapiniuose kopūstuose, brokoliuose, vasariniuose ir žieminiuose rapsuose, žirniuose ir pupose (pašarui ir maistui), liucernoje, auginamoje sėklai, kukurūzuose (tik cikloksidimui atspariuose), braškėse, vaismedžiuose, salotose, poruose, krienuose, dekoratyvinių ir miško medžių ir krūmų sodmenyse, auginamuose medelynuose, dekoratyviniuose augaluose (išskyrus miglinių šeimos augalus), dobiuose ir raudonuosiuose eraičiuose, auginamuose sėklai, ir gluosniuose, auginamuose kurui.

VEIKIMO BŪDAS

FOCUS ULTRA yra sisteminis herbicidas, gerai naikinantis tiek vienmetes, tiek daugiametes vienaskiltes piktžoles, išskyrus vienmetes migles. FOCUS ULTRA yra selektyvus daugeliui plačialapių kultūrų.

Veiklioji medžiaga įsisavinama per lapus ir juda augale į augančias dalis, sukeldama greitą stiebo ir šaknų irimą. Tuoj po nupurškimo augalų augimas staiga sustoja, bet efektas gali būti matomas tik po savaitės, priklausomai nuo oro sąlygų. Piktžolės pa-rausta ir, paėmus už viršūnės, lengvai išsirauna. Lapai visiškai nuyستا po 3–5 savaitių.

AUGALAI IR NORMOS

Augalai	Naudojimo norma	Naudojimo laikas augaluose	Pastabos
Braškės	1,0–4,0 l/ha Focus Ultra 2,0–4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus pirmiesiems lapams iki šešių lapų tarpsnio (BBCH 11–16). Tankesnė lapija trukdo įsisavinimui. Jei purškiami tarpueiliai – viso sezono metu.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 42 dienoms
Briuselio kopūstai	1,0–2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki stiebas pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–35). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn., iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms
Lapiniai kopūstai, Pekino kopūstai	1,0–2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriems lapeliams iki lapų rozetei pasiekus iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–35). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki rugpjūčio mėn., iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 42 dienoms
Brokoliai, žiediniai kopūstai	1,0–2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki žiedynas pasiekia 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms
Bulvės	1,0–4,0 l/ha Focus Ultra 2,0–4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Pasirodžius pirmajam lapui iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 10–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti kas trečius metus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	1,0–4,0 l/ha Focus Ultra 2,0–4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0–2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus pirmajam porai tikrųjų lapelių iki tarpueilių uždengimo (BBCH 12–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	

Augalai	Naudojimo norma	Naudojimo laikas augaluose	Pastabos
Gūžiniai kopūstai	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki gūžei pasiekus 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13-45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms
Kukurūzai tik veislės, atsparios cikloksidimui	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Dviejų – devynių lapelių tarpsnyje (BBCH 12–19).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms
Linai, pluoštiniai ir sėmeniniai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Linams esant „eglutės“ tarpsnyje (BBCH 12–19).	
Liucerna auginama sėklai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo vieno lapelio tarpsnio iki pirmųjų žiedynų pasirodymo (BBCH 11–51)	Tik sėkliniuose pasėliuose, nenaudoti pašariniuose
Morkos	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 2 tikriesiems lapeliams iki šaknims pasiekus 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 12–45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms
Pastarnokai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki šaknims ir gumbui pasiekus 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	
Šakninės petražolės	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo 3 iki 9 lapelių tarpsnio (BBCH 13–19).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms
Pupos (auginamos grūdams)	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo 2 tikrųjų lapelių tarpsnio iki bambklėjimo pabaigos (BBCH 12–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 56 dienoms

Augalai	Naudojimo norma	Naudojimo laikas augaluose	Pastabos
Pupos (žalios, su ankštėmis)	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo 2 tikrųjų lapelių tarpsnio iki bamblių pabaigos (BBCH 12–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms
Vasariniai rapsai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsivysčius 2 tikriesiems lapams iki 2 išėjusių tarpbamblių (BBCH 12–32). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	
Žieminiai rapsai	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsivysčius 2 tikriesiems lapams iki 2 išėjusių tarpbamblių (BBCH 12–32). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti kas trečius metus
Rapsiukai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo 3 tikrųjų lapelių tarpsnio iki bamblių pabaigos (BBCH 13–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	
Griežčiai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo 3-čio lapelio tarpsnio iki tarpvagių uždengimo (BBCH 13–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	
Salierai šakniavaisiniai, ropės	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki šaknims ir gumbui pasiekus 50 proc. būdingo dydžio (BBCH 13–45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms
Garbanotieji (Savojos) kopūstai	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki lapų rozetėi/gūzei pasiekus iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 21 dienai
Svogūnai, česnakai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo penkto tikrojo lapelio iki svogūnėliui pasiekus 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 15–45).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 28 dienoms

Augalai	Naudojimo norma	Naudojimo laikas augaluose	Pastabos
Žirniai (auginami grūdams)	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo dviejų tikrųjų lapelių ar ūsų išsivystymo iki bambėjimo pabaigos (BBCH 12–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 56 dienoms
Žirniai (žali, su ankštimis)	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Nuo dviejų tikrųjų lapelių ar ūsų išsivystymo iki bambėjimo pabaigos (BBCH 12–39). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 35 dienoms
Vaismedžių pomedžiai	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Iki vaisiams pasiekus pusę veislei būdingo dydžio (iki BBCH 76).	Purkšti ne vėliau kaip liepos mėnesį, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.
Dobilai, auginami sėklai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų	Nuo dviejų lapelių tarpsnio iki pirmųjų žiedynų padidėjimo pasirodymo (BBCH 12-51).	Tik sėkliniuose pasėliuose, nenaudoti pašariniuose
Raudonieji eraičiniai, auginami sėklai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų	Nuo 4 tikrųjų lapelių tarpsnio iki 4 bamblio tarpsnio (BBCH 14-34).	Tik sėkliniuose pasėliuose, nenaudoti pašariniuose
Porai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų	Nuo antro tikrojo lapelio iki svogūnėliui pasiekus 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 12-45).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 42 dienoms.
Salotos	1,0-2,0 l/ha Focus Ultra 2,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų.	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki lapų rozetei/ gūžei pasiekus iki 50 proc. veislei būdingo dydžio (BBCH 13–45).	Purkšti ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 21 dienai
Krienai	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienmečių vienaskilčių ir javų pabirų	Išsiskleidus 3 tikriesiems lapeliams iki šaknis pasiekia 50% būdingo dydžio (BBCH 13-45). Tankesnė lapija trukdo herbicido įsisavinimui.	

Augalai	Naudojimo norma	Naudojimo laikas augaluose	Pastabos
Gluosniai, auginami kurui	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų	Sezono metu	
Miško medžių ir krūmų sodmenys, auginami medelynuose	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų	Sezono metu	
Dekoratyviniai augalai (išskyrus miglinių šeimos augalus)	1,0-4,0 l/ha Focus Ultra 2,0-4,0 l/ha purškiama nuo varpučio. 1,0-2,0 l/ha purškiama nuo vienamečių vienaskilčių ir javų pabirų	Sezono metu	

PABIROMS NAIKINTI RAPSŲ PASĖLIUOSE YRA 3 GALIMYBĖS:

- 1,0–1,5 l/ha FOCUS ULTRA + 0,5 l/ha Dash naudokite, kai pabiros yra 1–3 lapelių tarpsnyje. Didžioji norma naudojama nuo žieminių javų pabirų. Maišymui su FOCUS ULTRA geriausiai tinka tik paviršiaus aktyvioji medžiaga Dash, jei bus naudojamos kitos PAM, gero veikimo negarantuojame.
- 0,5–1,0 l/ha FOCUS ULTRA galima purkšti kartu su BUTISAN STAR arba BUTISAN AVANT iki rapsai turi 4 lapus (BUTISAN STAR taip pat neblogai veikia nuo pabirų, todėl galima naudoti sumažintą FOCUS ULTRA normą).
- FOCUS ULTRA reikia purkšti per 2 kartus, normą padalinant, jei pabirų labai daug ir jos dygsta ilgą laiko tarpą (taip būna, kai sėjama į neartą dirvą). Pirmą purškimą galima daryti mišinyje su BUTISAN STAR ar BUTISAN AVANT, o antrą – su JUVENTUS 90:

Vasarinių javų pabiros:

I kartą FOCUS ULTRA 0,5 l/ha + DASH 0,5 l/ha

II kartą FOCUS ULTRA 0,5 l/ha + DASH 0,5 l/ha

Žieminių javų pabiros:

I kartą FOCUS ULTRA 0,7 l/ha + DASH 0,5 l/ha

II kartą FOCUS ULTRA 0,7 l/ha + DASH 0,5 l/ha

Mažesnę FOCUS ULTRA normą naudokite palankiomis augimui sąlygomis, kai piktžolėtumas nėra labai didelis.

Didžiausias normas naudokite, esant prastesnėms augimo sąlygoms, kai purškiate pavėluotai. Laikoma, kad pabiras verta naikinti, kai jų yra bent 1 vnt/100 cm².

FOCUS ULTRA nenaikina miglių, nuo jų gerai veikia BUTISAN STAR bei BUTISAN AVANT.

PASTABOS

- Optimalios augimo sąlygos – šiltas oras ir pakankamai drėgna dirva – leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
- Kaitri saulė ir sausas oras gali sumažinti herbicido poveikį. Tokiomis sąlygomis purškite vakare, naudokite didesnes rekomenduojamas FOCUS ULTRA normas.
- Purškite ant sausų lapų, kai lietaus nesitikima mažiausiai 1 valandą.
- Poveikis paprastajam varpučiui priklauso nuo pačios kultūros sugebėjimo jį stelbti. Pvz.: tankesniame rapsų pasėlyje varputis būna ištįsęs ir silpnas, todėl lengviau pažeidžiamas. Mažai varputį stelbiančiose kultūrose, tokiose kaip cukriniai runkeliai, naudokite didesnes FOCUS ULTRA normas arba purškite du kartus.
- Panaudojus Focus Ultra ir susidarius palankioms varpučiui augimo sąlygoms, jis gali atželti, tačiau dažniausiai FOCUS ULTRA poveikis būna ilgalaikis ir veikimas jaučiamas kitais metais.
- Nedirbkite dirvos tiek prieš, tiek po FOCUS ULTRA panaudojimo (bulvėse ar cukriniuose runkeliuose).

MAIŠYMAS

FOCUS ULTRA galima maišyti su fungicidais JUVENTUS 90, SIGNUM, herbicidais BUTISAN AVANT, BUTISAN STAR, BUTISAN KOMBI, STOMP SC, augimo reguliatoriumi CARYX bei mikroelementinėmis trąšomis.

PURKŠTUVO PLOVIMAS – ATKREIPKITE DĖMESĮ !

Prieš užpildydami purkštuvą, kruopščiai jį išplaukite tam tinkančiomis plovimo priemonėmis, tiek purkštukus, tiek ir filtrus. Kai kurių herbicidų likučiai susimaišę su FOCUS ULTRA gali pakenkti augalams. Ypač svarbu gerai išplauti visą purkštuvą, jei prieš tai buvo naudojami herbicidai iš sulfonilurėjos grupės, laikykitės šių produktų etiketėje esančių reikalavimų purkštuvo plovimui.

Vandens kiekis – 200–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.